



آمفالوسل چیست؟

یک نوع ناهنجاری مادرزادی در بدو تولد است که در آن قسمتی از محتویات شکم داخل بند ناف می شود. آمفالوسل به وسیله یک کیسه یا غشاء شفاف که بند ناف به آن چسبیده پوشیده شده است.

علائم و نشانه ها:

بیرون زدگی احشاء شکمی از طریق حلقه ناف با قطر بیش تر از 4 سانتیمتر، عدم به هم پیوستگی دیواره های جانبی شکم طی هفته سوم جنینی

اقدامات تشخیصی :

از طریق سونوگرافی در سه ماهه دوم و سوم بارداری در غیر این صورت بلافاصله بعد از تولد

اقدامات درمانی :

عمل جراحی در 24 ساعت اول تولد

- 1- اگر آمفالوسل کوچک باشد محتویات کیسه به داخل شکم برگردانده می شود.
- 2- اگر آمفالوسل بزرگ باشد (قسمت زیادی از محتویات شکم داخل کیسه باشد) یک کیسه پلاستیکی استریل روی محتویات شکم گذاشته می شود و زمانی که محتویات شکم تحت جاذبه وارد حفره شکمی شد که حدود 10 روز طول می کشد نوزاد تحت عمل جراحی قرار گرفته و بخش ورودی با جراحی بسته می شود.

اقدامات و مراقبت های قبل از عمل جراحی:

- *نوزاد قبل از جراحی و مدتی پس از آن نباید تغذیه شود.
- *جهت خروج محتویات معده برای نوزاد لوله معده از طریق دهان یا بینی گذاشته می شود.
- *جهت شروع تغذیه کامل وریدی (TPN) رگ گرفته می شود.
- *برای جلوگیری از خشک شدن کیسه روی آن پانسمان گرم و مرطوب و استریل گذاشته می شود.
- *هیچ گونه فشاری نباید به شکم نوزاد وارد شود.
- *نوزاد در وضعیت خوابیده به پشت باشد.
- *سونوگرافی جهت بررسی وضعیت قلب و مغز و مجاری ادراری نوزاد انجام می شود.

اقدامات و مراقبت های بعد از عمل:

- *نوزاد چندروز بعد از عمل نمی تواند شیر بخورد و لوله معده دارد.
- *نوزاد تا یک هفته با سرم غذایی (TPN) تغذیه کامل وریدی می شود.
- *محل عمل جراحی پانسمان استریل گذاشته می شود.
- *ممکن است نوزاد تا چند روز بعد از عمل به دستگاه تنفس مصنوعی وصل باشد.
- *در مدتی که نوزاد شیر نمی خورد تا زمان شروع شیر برای نوزاد، مادر باید جهت جلوگیری از کاهش تولید شیر مرتب شیر را دوشیده و فریز کند تا بعد از شروع رژیم از آن استفاده کند.

زمان ترخیص بیمار:

- ✓ زمانی که نوزاد شما بتواند به اندازه کافی شیر بخورد و وزن بگیرد
- ✓ تنفس نوزاد مشکلی نداشته باشد
- ✓ مشکلی در دفع مدفوع نداشته باشد
- ✓ دمای بدن نوزاد پایدار و تب نداشته باشد.

مراقبت ها و پیگیری های بعد از ترخیص:

- 1-اولین ویزیت یک هفته بعد از ترخیص و مراجعات بعدی طبق دستور پزشک
- 2-استحمام سه روز بعد از ترخیص (عدم استفاده از صابون و شامپو و کرم در ناحیه عمل جراحی مگر با دستور پزشک)
- 3-در صورت بروز علائم زیر سریع به پزشک مراجعه شود:

* مشکلات دفعی و تغذیه ای و تنفسی

* استفراغ سبز یا زرد رنگ به دفعات زیاد یا جهنده

* تورم و سفتی شکم

* قرمزی و تورم ناحیه عمل جراحی

* خروج خون و ترشح از ناحیه عمل جراحی

* تب و بی حالی

منبع: پرستاری کودکان ونگ

مشاوره علمی: دکتر محمد امید (فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان)

واحد آموزش به بیمار

مدیر آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع)